

La Revascularisation de l'IVA Proximale Données de la HAS

PAS DE CONFLIT D'INTERET

SEPTEMBRE 2002

Dans les suites de RAVEL
Indication du CYPHER pour sténose IVA proximale... ..
sur avis d'experts

MAI 2004

Dans les suites de TAXUS IV

Indication du TAXUS express sur IVA proximale

Puis extension de l'indication à tous les DES...

JUILLET 2009

«En l'absence de données cliniques probantes, les sténoses de l'IVA proximale ne peuvent être considérées à elles seules comme des indications à l'utilisation des stents actifs »

Registre de Lee et al. SES implantation for treatment of proximal left anterior descending coronary artery lesion : Long-term outcome and predictors of adverse cardiac events (Catheter. and cardiovasc. Interv. -2007)

Registre prospectif monocentrique, 966 patients

A 9 mois décès = 1% IDM = 2% TLR=2,3%

A 1 an MACE = 3,3%

Registre de Khattab et al. Incidence and predictors of target vessel revascularization after sirolimus-eluting stent treatment for proximal left anterior descending artery stenoses among 2274 patients from the prospective multicenter German Cypher Stent registry (Clin. Research Cardiol. – 2007)

Registre multicentrique allemand, 2274 patients

A 6 mois Mortalité = 1,5% IDM = 1,2% AVC=0,5%

« Les données provenant de 2 registres non comparatifs ne permettent pas de conclure sur le rapport efficacité – Sécurité en l'absence de comparaison »

La Revascularisation de l'IVA Proximale

Les données de la HAS

CONTROVERSE

