



Insuffisance Cardiaque Aspects Néphrologiques

Y. Dimitrov
CH Haguenau


Syndrome Cardio Rénal

- S. Andrieu (Avignon)
- Question « Connaissez-vous le SCR ? »
 - Non 62 %
- 30 réponses sur 2000 envois



Prevalence

ADHERE Database

- 118,465 hospitalisations pour ADHF
- Pcr moyenne : 18 mg/L
- DFGe moyen 55,2 ml/min/1,73m²




Valeur pronostique de l'insuffisance rénale




Physiopathologie

Hyperactivation sympathique




SRAA




Anémie

A




B





Stress oxydant



Dysfonction endothéiale



Synthèse







Surcharge Hydro-sodée




Figure 3


Relative contributions of central venous pressure (CVP) and cardiac index (CI) to glomerular filtration rate (GFR) at time of pulmonary artery catheter removal

Error bars represent 95% confidence interval. Cut-off values for CI = 2.4 l/min.m² and CVP = 8 mmHg.

[Importance of Venous Congestion for Worsening of Renal Function in Advanced Decompensated Heart Failure](#)


J Am Coll Cardiol. J Am Coll Cardiol;53(7):589-596.

RELATION PVC/MORTALITE



Damman, K. et al. J Am Coll Cardiol 2009;53:582-588


Blocage séquentiel du tubule



TTT insuffisance cardiaque

- Triatec 10 1-0-1
- Tahor 40 0-0-1
- Kardegeic 75 1-0-0 **ALDACTONE ?**
- Cardensiel 1,25 1-0-0
- Lasilix 500 1-1-0
- Diffu-K 2-2-2

Etudes RALES




Surveillance


Poids +++

Créatinine

Les pièges du poids



Cinétique



TTT original ?

Dialyse Péritonéale

DIALYSE PERITONEALE

Scheneierson	1949				
Gotloib	2005	Allemagne	20	↗	N
Simpson	1986	GB	9	↗	C
Bilora	2002	Italie	16	↗	G
Okada	2002	Japon	2	↗	G
Grapsa	2004	Grece	18	↗	N
Weinrauch	1984	Allemagne	15	↗	N
Aggarwal	2002	Inde	20	↗	G
Bar-Zohar	2006	Israel	34	↗	G
Mousson	1988	France	19	↗	G
Bertoli	2005	Italie	2	↗	N
Takane	2006	Japon	16	↗	N
Diez-Ojea	2007	Espagne	5	↗	N
Tormey	1996	Irlande	3	↗	G
Konig	1987	Allemagne	4	↗	G
Stegmayr	1996	Suede	16	↗	N
Ryckelynck	1997	France	16	↗	N
Ortiz	2003	Chili	3	↗	N
Gotloib	2006	Israel	20	↗	N
Kagan	2005	Israel	3	↗	N

Résultats de la Dialyse Péritonéale

- 20 patients, NYHA IV
- TTT maximal
 - Indication de soins palliatifs
 - Mortalité attendue à 1 an 75 %
- TTT par DP
- Survie à 1 an 90 %
- Nombre de jours d' hospitalisation/an
 - Avant DP 157
 - Après DP 13

Conclusion

- Fréquent
- Poids
- Accumuler les diurétiques/Aldactone
- Dialyse péritonéale ?