

# Traitement des anévrismes et fistules coronaires

***P. Commeau***

Polyclinique Les Fleurs, Ollioules

5 6 7  
JUN 2019




- Pas de conflit d'intérêt avec la présentation

5 6 7  
JUN 2019



# Angor d'effort et hémoptysie











5 6 7  
JUN 2019

# Coils à détachement contrôlé













5 6 7  
JUN 2019



# Angor d'effort, T<0 V1-V3, Dyskinésie septale




5 6 7  
JUN 2019










5 6 7  
JUN 2019





5 6 7  
JUN 2019


# Douleur thoracique avec épanchement péricardique





5 6 7  
JUN 2019








































5 6 7  
JUN 2019




# Parfois, faire simple (plus simple)














5 6 7  
JUN 2019


# Coronarographie






Penumbra Coil 400™  
1.8x30 cm Coil  
Packing Density: 27.5%








first, frame loading

5 6 7  
JUN 2019






5 6 7  
JUN 2019




5 6 7  
JUN 2019








5 6 7  
JUN 2019



# Pas toujours congénital




5 6 7  
JUN 2019




10 ans plus tard





**Longueur : 74 mm**  
**Diametre : 38 mm**  
**Partiellement thrombosé**








Figure 2

Plaque  
ePTFE graft  
Nitinol stent







Photograph of several sizes of the GORE VIABAHN® Endoprosthesis



- 5 ou 6 mm de diametre
- 50 ou 100 mm de longueur
- 0.035''








5 6 7  
JUN 2019




5 6 7  
JUN 2019

# Résultat final










- En 2008, hospitalisation pour SCA.... Traitement espacé sur 7 ans
- Utilisation de ballons détachables, puis de coils , puis encore de coils et enfin de plugs



5 6 7  
JUN 2019



5 6 7  
JUN 2019



1. Un cardiologue interventionnel doit savoir utiliser des coils, des plugs, des stents couverts périphériques car :
2. Il fait de la CTO et doit boucher des perforations
3. Il fait du TAVI et doit réparer une complication ilio-fémorale
4. Il ferme des fuites para-valvulaires et doit manier des plugs
5. Donc connaître le matériel et les catalogues des produits à disposition