Le Cathlab 2.0

**Simuler pour mieux
soigner**

**Caroline REYNAUD
(Chambery)**

Simuler pour mieux soigner

Un outil d'amélioration de la sécurité du patient

Caroline Reynaud

6 juin 2024

Une rapide présentation

- CHMS (Savoie), seule salle de coronarographie du département
- 3 Cardiologues plein temps, 1 temps partiel et 2 vacataires
- 5 IDE
- 6 MER
- 1 aide-soignante dédiée les matins
- 1 cadre
- 2000 examens/an
- 950 angioplasties
- 400 patients en urgence ou urgence différée

Et HopSim?

- 2006 : création du Centre d'enseignement des soins d'urgence de la Savoie (CESU73)
- 2010 : création du Centre d'enseignement par simulation (CEnSIM)
- Aujourd'hui Hospim®, l'hôpital simulé
- Sa mission: Le Centre travaille à diversifier ses programmes de formation par simulation en lien avec les équipes médicales sur différentes thématiques (Urgence, anesthésie, réanimation)

Le fonctionnement

- Il y a toujours au moins 3 personnes en salle:
- Le cardiologue
- Un IDE
- Un MER
- En semaine, un second cardiologue (ou un « fellow ») se rajoute à l'équipe et une As vient renforcer le tout le matin.

Une organisation pas si simple

- Un scénario préparé à l'avance par une équipe machiavélique (un médecin du CenSim et un cardiologue de l'équipe)
- Le mannequin qui doit voyager en ambulance
- Le programme à aménager

Petit zoom sur le mannequin

- Simman 3G de Laerdal
- Parle,
- Permet l'injection veineuse, la ponction artérielle, a des mouvements respiratoires, ouvre et ferme les yeux, a des pouls périphériques.

L'équipe se met en situation: notre patient

SAMU 73 - SMUR DE CHAMBERY Date: 30/04/2024

Patient	Intervenants	Intervention
Nom: NALINE Prénom: Andie Sexe: M ☒ F ☐ Né(e) le: 25/02/1959 Age: ans ☐ mois ☐ Tuteur / Curateur / Titulaire de l'autorité parentale si mineur: _____ Adresse: 98 chemin des Hommes 73 230 St-Jean d'Arvey Tél: _____ Tél. entourage: 06 58 62 93 28 Parenté: Entourage prévenu oui ☒ non ☐ (époux)	Méd SMUR: DUBRE Infirmier: RUBACETTI Ambulancier: DUPONT Autre: _____ Méd sur place: _____ ISP: _____ SMUR Primaire ☒ Secondaire ☐ UVIH ☐ Chambéry: ☒ Aix-les-Bains ☐ Véhicule: R 22 Pedibus ☐ Hélico: _____ Jonction: _____	Motif: Douleur thoracique Lieu de PEC: Domicile Lieu de travail Horaires Appel C15: H Départ lieu: H Déclenchement: H Fin méd: H Départ: H Retour dispo: H Arrivée lieu: H
Antécédents Tabac: 50 PA Allergies: ☒ ATCD AG ☐ Observation: Douleur thoracique: - Douleur thoracique instable - Non migratoire - Début vers 22h - Survenue lors d'un effort, et persiste dans les suites - Non précédée d'angor et/ou effort du j. précédent. 1 ^{er} épisode et dyspnée et malaise A notre arrivée: Glasgow 15 Hémodynamique stable SpO ₂ 98% en Air. Douleur persistante.		Traitement habituel ECG: sinusuel, sus-ST an inférieur. An. total: SCA ST+ inférieur < 12h Décision angioplastie percutanée Méd. trait. par: Aspirine 250mg IV Prasogrel 60mg Po HNF0 (Sida si faut): Bolus 11,5ml puis v3,9 Prasistamol 1g orodispersible Morphine en titration 6mg

Comme à la maison

- Le matériel sorti est celui de tout examen, l'installation est la même, la ponction artérielle, tout est identique à un examen habituel, on utilise même nos médicaments injectables pour éviter toute erreur au retour à la normale.

Au boulot,

Et là, forcément, quand ça dérape

- On masse

- On sort le défibrillateur
- Un peu d'adrénaline
- On recommence

Mais rien ne se passe comme prévu

- Le cœur ne redémarre pas!
- Et donc , voilà qu'arrive la nouveauté pour nous: double défibrillation séquentielle.

Penser à l'ECPR !!

Dose max de 5 mg d'Adrénaline
Dès que **décision d'ECPR (ECMO VA) prise : ARRÊT** injection Adrénaline

	<p>Défibrillation standard</p> <ul style="list-style-type: none"> - Placement des patches en antéro-latéral : 1^{er} au-dessus du pectoral droit et 2^{ème} en regard ligne médio-axillaire gauche (V6) - Utilisée pour les 3 premiers chocs
	<p>Défibrillation antéro-postérieure</p> <ul style="list-style-type: none"> - Placement des patches en antéro-postérieur : 1^{er} sous le pectoral gauche, grand axe en position horizontale. 2^{ème} entre la scapula gauche et le rachis - Utilisée à partir du 4^{ème} choc si un seul défibrillateur disponible
	<p>Double défibrillation séquentielle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Placement de quatre patches (de deux défibrillateurs) selon les deux méthodes ci-dessus - Défibrillation séquentielle : chocs administrés l'un après l'autre le plus rapidement possible (< 1 seconde) - Utilisée à partir du 4^{ème} choc si deux défibrillateurs disponibles

Vidéo de formation : <https://www.youtube.com/watch?v=1mr5VvdSp6c>
D'après Cheskes S et al. Defibrillation Strategies for Refractory Ventricular Fibrillation. *N Engl J Med.* 2022. doi:10.1056/NEJMoa2207304

Débriefing: Le déroulé de l'intervention

Temp - choc

Consent
 TA ok
 Douveaux
 Bradycardie II GI + passage Gent
 III aspté
 SpO2 ok
 VVP fonctionnelle
 Patch de def pose

Debut de procédure TA ok.

FV / cyanose / inconsent. / course TA plate

CHOC I
 CHOC II préparation Adré 5mg ds 5ml
 O2 FHC 15% posé au robinet au plus prêt. CHRONO

MCE
 CHOC III préparation cordarone 2A
 Adrenaline 1mg. 300mg par

CHOC IV
 Cordarone 300mg.

BAVV
 CHOC V Appel Reo → ECMO - propose double def.

Adré 1mg.

CHOC VI double def
 CHOC VII " " préparation cordarone 150mg
 CHOC VIII " " Appel Reo

RACS - Appel Reo

Ce qui en découle

- On se remet de ses émotions!
- On voit ce qui va bien
- On revoit des bases
- On cherche ensemble des axes d'amélioration

On s'entraîne

Les difficultés

- Grosse organisation à mettre en place, techniciens équipe Cesu, Préparation de la salle en amont
- Salle « bloquée » qui doit rester utilisable rapidement en cas d'urgence.
- Mannequin fragile et qui doit voyager en ambulance.
- Equipe CenSim très sollicitée
- Un coût non négligeable

Mais les points forts

- On est dans nos « meubles », on connaît les lieux , les tiroirs et surtout les autres intervenants. Cela concourt à renforcer la cohésion d'équipe.
- On connaît tous des situations d'urgence mais heureusement pas trop souvent et la répétition améliore la prise en charge
- On prend confiance en nous et en l'équipe
- On répète des situations d'urgence sans aucun risque. Se tromper n'a pas d'incidences.

Merci de votre attention

A vos questions