

Les Paramedi'cas



**Quand le stent fait
des vagues**

**Marion THOUVENOT
(Paris)**

Quand le stent fait des vagues, la douleur prend l'homme.

APPAC 2024

THOUVENOT Marion

Présentation

- Patiente Mme DUPONT, 66 ans, vient pour une coronarographie sur un angor de novo.
- Antécédent : -obésité
 - ancienne fumeuse
 - diabète
 - FA parox
 - hyperthyroïdie
 - Cardiopathie ischémique FEVG 40%

(2022 ST+ ATL TC-IVA, thrombose aiguë IVA proximale orage rythmique thromboaspiration)

 - ECG avec séquelle antérieure

1er angioplastie

Difficultés des voies d'abord échec des deux radiales passage en fémorale droite, passage en 6f pour l'angioplastie de la lésion de bifurcation, utilisation :



- Sion blue dans Cx
- BMW dans IVA
- SC 2.5 12 en pré-dilatation
- Synergy 3x24 mm 14 ATM pour le stent
- on termine avec un Kissing 3.0 3.0
- fermeture avec un angioseal 6f


SALLE DE REVEIL

- Sortie de salle de Coro scopée dans la salle de réveil sans personnel pour la surveiller.
- Enchaînement du programme, 15 mins après ATL, la patiente se plaint de douleur thoracique sans irradiation et m'intercepte pour me le signaler.
- Réaction IDE:
 - 1) Médecin prévenu directement.
 - 2) ECG fait.
 - 3) Antalgique fait.


SALLE DE REVEIL

- 5 minutes après ...malaise de la patiente avec un état de choc cardiogénique hypotension, bradycardie et perte de connaissance, réaction :
 - 1) Appel de la réanimation.
 - 2) Drogues d'urgence .
 - 3) Échographie transthoracique faite par le médecin.

Image OCT




REPRISE EN SALLE DE CORO




- **sur le plan Réanimation :**
 - pose de KTC fémoral gauche,
 - support ventilatoire non invasif
 - Vasopresseur.
- **Coté coronarographie :**
 - antiagrégants plaquettaires fait,
 - OCT fait confirmation sténose intra stent,

➡ angioplastie sans pose de stent et thrombectomie.




CONCLUSION



→ Succès de recanalisation de l'ostium de l'artère CX proximale avec thrombectomie sans stent,

→ Procédure réalisée sous OCT avec optimisation du stent implanté dans la circonflexe.



Take Home Message

- FEI sur l'absence d'une IDE dans la salle de réveil,
- Mise en avant du poste d'accueil,
- Arrêt du fermeture de ce poste par la suite,

➡ si absence IDE attente de la remonté du patient qui a eu une angioplastie avant d'installer le suivant.